

Informationen zum Medikament Virecta 100 mg

Hersteller von Virecta 100mg Tabletten: Eva Pharma, Ägypten

Vertrieb der Original Virecta 100mg Tabletten im Internet: www.pillenpeter.com

Arzneilicher Wirkstoffstoff einer Virecta 100mg Tablette:

Eine Virecta 100mg Tablette enthält 100 mg Sildenafil (als Sildenafilcitrat).

1-[[3-(1-Methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazin

Packungsgrösse und Eigenschaften von Virecta 100mg Tabletten:

Virecta 100mg Tabletten werden auf einem Blister zu drei Stück hergestellt. Virecta Tabletten werden nur mit einer Dosierung von 100mg Sildenafil produziert. Eine Virecta Tablette ist durch eine Kerbung in der Mitte leicht teilbar.

Virecta Tabletten enthalten als Wirkstoff Sildenafil. Was ist eigentlich Sildenafil?

Sildenafil gehört zu einer Gruppe von Medikamenten, die man als Phosphodiesterase-5-Hemmer bezeichnet. PDE-5 Hemmstoffe sind für Männer erhältlich, die an Impotenz (besser bezeichnet als „Erektile Dysfunktion“, abgekürzte Schreibweise „ED“ oder auch „EDS“) leiden. Umgangssprachlich werden Virecta 100mg Tabletten auch als Potenzmittel oder Erektionshilfen bezeichnet. Eine Virecta 100mg Tablette ist kein Aphrodisiakum und steigert nicht die sexuelle Lust (Libido).

Wie wirken Virecta 100mg Tabletten?

Der Wirkstoff Sildenafil in Virecta 100mg Tabletten sorgt im Penis für eine Erweiterung der Blutgefässe. Somit kann mehr Blut in den Penis einströmen und es entsteht wieder eine harte und feste Erektion. Dies geschieht jedoch nur - wie auch beim Gesunden - wenn gleichzeitig eine sexuelle Stimulation stattfindet. Die Wirkung kann bereits 15 bis 30 Minuten nach der Einnahme eintreten. Die Erektion endet ganz natürlich mit dem Orgasmus bzw. dem Samenerguss. Je nach den individuellen Gegebenheiten sind innerhalb des Wirkzeitfensters von 4-5 Stunden jedoch weitere Erektionen möglich.

Wirken Virecta 100mg Tabletten immer und in jedem Fall?

Wie andere Medikamente, wirken auch Virecta 100mg Tabletten nicht immer und nicht in jedem Fall. Abhängig von der Grunderkrankung und der Dosierung kann bei über 80% der Männer eine Verbesserung der Erektion erreicht werden. Bedenken Sie, dass die Anspannung vor dem ersten Geschlechtsverkehr nach langer Pause so gross sein kann, dass eine Wirkung verhindert wird. Versuchen Sie diese Anspannung abzubauen und es an anderen Tagen ggf. noch einmal zu probieren. Falls der Wirkstoff Sildenafil in Virecta 100mg Tabletten bei Ihnen trotz mehrfacher Versuche überhaupt nicht wirkt, die Erektion unter Virecta 100mg Tabletten nicht lange genug anhält oder nicht hart genug ist, sollten Sie dies mit einem Arzt besprechen. Es gibt noch andere Behandlungsmöglichkeiten der erektilen Dysfunktion (Impotenz), z.B. Medikamente zur Injektion in den Penis oder Vakuumpumpen.

Wie sollte man Virecta 100mg Tabletten einnehmen?

Virecta 100mg ist ein Medikament, ein Potenzmittel gegen Impotenz, und sollte möglichst nach ärztlichem Rat eingenommen werden. Es gibt Virecta 100mg Tabletten (mit dem weltbekannten Wirkstoff 100mg Sildenafil) nur in einer Wirkstärke (100 mg Sildenafil pro Virecta Tablette) auf dem Potenzmittelmarkt. Ein Arzt kann die Dosis bestimmen, die geeignet für Sie ist. Die normale Dosierung beträgt eine Virecta 100mg Tablette. Ältere Patienten berichten aber auch über gute Erfolge mit der halben Dosierung (entspricht etwa 50mg des Wirkstoffes Sildenafil), also einer halben Tablette Virecta 100mg. In der Regel gilt: Eine Virecta 100mg Tablette sollte etwa eine Stunde vor dem Geschlechtsverkehr eingenommen werden. Die Zeit bis zum Eintreten der Wirkung liegt i.d.R. zwischen 15-60 Min., im Mittel bei 25 Min., ist jedoch bei jedem Menschen verschieden. Die Wirkung hält etwa vier bis fünf Stunden an. Nach einer fettreichen Mahlzeit kann die Wirkung verzögert eintreten. Fettreiche Nahrung sollte bei einer Potenzmittel-Therapie mit Virecta 100mg Tabletten ausdrücklich vermieden werden!

Was passiert bei einer Steigerung der Dosis von Virecta 100mg Tabletten?

Eine Steigerung der Dosis wegen unzureichender oder fehlender Wirkung sollten Sie grundsätzlich nicht ohne ärztlichen Rat durchführen. Auf keinen Fall darf die tägliche Höchstdosis eine Virecta 100mg Tablette überschreiben! Gehen Sie bitte sehr verantwortungsvoll und sorgsam mit Ihrer Gesundheit um!

Informationen zum Medikament Virecta 100 mg

Welche Nebenwirkungen haben Virecta 100mg Tabletten (Sildenafil Citrate)?

Nebenwirkungen können auftreten, müssen jedoch nicht. Wie alle Medikamente, können aber auch Virecta 100mg Tabletten, die den bereits erwähnten Wirkstoff Sildenafil enthalten, Nebenwirkungen hervorrufen. Diese Nebenwirkungen sind zumeist leichter bis mässiger Art und vorübergehend. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen und Gesichtsröte. Weniger häufig treten Schwindel, eine verstopfte Nase (auch u.U. Schnupfen), Herzklopfen und Beeinträchtigungen des Sehens (erhöhte Lichtempfindlichkeit, Veränderungen des Farbsehens und unscharfes Sehen), Hautausschlag, Jucken, Gesichtsschwellung, geschwollene Lippen, Kurzatmigkeit, Asthmaanfall oder Blutdruckabfall (von Schwindel bis Ohnmacht). In sehr seltenen Fällen wurde unter der Einnahme von Phosphodiesterase-5-Hemmern, zu dieser Arzneigruppe gehört auch Virecta, über das Auftreten eines dauerhaften Sehverlustes berichtet. Bislang ist unklar, ob es einen ursächlichen Zusammenhang mit der Einnahme dieser Medikamentengruppe gibt. Muskelschmerzen können auftreten, wenn Virecta 100mg Tabletten mehr als einmal täglich eingenommen werden (davon wird an dieser Stelle nochmals dringend abgeraten). In sehr seltenen Fällen kann nach der Einnahme von Virecta 100mg Tabletten eine übermässig lang anhaltende und gegebenenfalls schmerzhaft erektionen auftreten. Wenn Sie eine derartige mehr als 4 Stunden andauernde Erektion (sogenannte schmerzhaft erektion) haben, sollten Sie umgehend einen Arzt bzw. Notarzt rufen, da ein solcher Zustand eine Notfallsituation darstellt und zu einer unheilbaren Penisbeschädigung führen kann. Fälle von akutem Myokardinfarkt, Hirnschlaganfälle oder/und cerebralen Krampfanfällen können auftreten. Letztere Fälle stehen aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht im Zusammenhang mit der Einnahme des Wirkstoffes Sildenafil, sondern sind dann meist eine Verkettung „unglücklicher Umstände“, die möglicherweise ursächlich auf eine Reihe von (kardiologischen) Vorerkrankungen zurückzuführen sind.

Sollte bei Ihnen der aussergewöhnliche Umstand eintreten, dass Sie auf den Wirkstoff Sildenafil, der in Virecta 100mg Tabletten, enthalten ist, allergisch reagieren konsultieren Sie bitte umgehend einen Arzt bzw. bei einem lebensbedrohlichen, allergischen Schock (anaphylaktischer Schock), den Notarzt! Falls Sie oben genannte, unerwünschte Wirkungen bei sich beobachten und diese Sie stören oder stark sind oder bei Fortsetzung der Behandlung mit Virecta 100mg Tabletten nicht verschwinden oder sich verschlimmern (besonders Brustschmerzen), sollten Sie mit einem Arzt darüber sprechen.

Wer darf Virecta 100mg Tabletten (Sildenafil Generikum) nicht einnehmen?

Virecta 100mg Tabletten darf nicht von Patienten eingenommen werden, die Medikamente einnehmen, die Nitrate (dazu zählt insbesondere auch Nitrolingual-Spray!) und Molsidomin enthalten. Dies sind Medikamente, die hauptsächlich bei Angina pectoris (Schmerzen in der Brustgegend durch Verengung der Herzkranzgefässe) genutzt werden. Daneben gibt es noch andere Medikamente (z.B. sogenannte Alpha-Blocker), die nicht in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit Virecta 100mg Tabletten eingenommen werden dürfen. Virecta 100mg Tabletten sollten weiterhin nicht eingenommen werden, wenn Sie eine Allergie gegen einen Bestandteil (Sildenafil oder Hilfsstoffe, die zur Tablettenzubereitung genutzt werden, therapeutisch aber unbedeutend sind) der Tabletten haben, an schweren Leberschäden leiden, unter schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie schwerer Herzinsuffizienz oder instabiler Angina Pectoris leiden, kürzlich einen Schlaganfall oder Herzinfarkt hatten, an niedrigem Blutdruck leiden, oder an Retinitis pigmentosa (erbliche Augenerkrankung) leiden. Da es bei einigen Medikamenten (AIDS-Medikamenten, einzelne Antimykotika und Antibiotika) zu einer Erhöhung des Medikamentenspiegels im Blut und zu einer Verlängerung der Verweildauer im Körper kommen kann, sollten Sie unbedingt auf die Einnahme von Virecta 100mg Tabletten verzichten. Verständlich ist auch, dass Männer, denen ein Arzt aufgrund einer Krankheit von sexueller Aktivität abgeraten hat, auch keine Virecta 100mg Tabletten einnehmen sollten. Virecta 100mg Tabletten sollten nicht gleichzeitig mit Alkohol eingenommen werden. Bei Drogenmissbrauch sind Virecta 100mg Tabletten grundsätzlich kontraindiziert! Insbesondere sei hier vor der Szene-Droge „Poppers“ gewarnt! Hierbei kann es zu lebensbedrohlichem Blutdruckabfall kommen. Bei einer solchen Notfallsituation ist die sofortige Hinzuziehung eines Notarztes unter ausdrücklicher Schilderung der genannten tatsächlichen Zusammenhänge (zum Wirkstoff Sildenafil und „Poppers“) unerlässlich! Kinder, Jugendliche, Schwangere oder Greise und Gebrechliche dürfen Virecta 100mg Tabletten nicht einnehmen!

Bei welchen Erkrankungen sollten Virecta 100mg Tabletten nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Besondere Vorsicht vor Einnahme von Virecta 100mg Tabletten sollte bei Verformungen des Penis und Induratio penis plastica (einer Krankheit, bei der Verhärtungen des Penis zu einer Verformung führen) angewendet werden. Ebenso bei Erkrankungen, bei denen es zu verlängerten Erektionen kommen kann, wie z.B. Erkrankungen des blutbildenden Systems. Ausserdem bei Erkrankungen mit erhöhter Blutungsneigung (Hämophilie) oder bestehenden Magengeschwüren.

Informationen zum Medikament Virecta 100 mg

Kann man mit Virecta 100mg Tabletten noch Auto fahren?

Die Einnahme von Virecta 100mg Tabletten kann selten Schwindel und Sehstörungen hervorrufen. Achten Sie deshalb darauf, wie Sie auf die Einnahme von Virecta 100mg Tabletten reagieren, bevor Sie Auto fahren oder Maschinen bedienen. Grundsätzlich raten wir Ihnen davon ab.

Können Frauen auch Virecta 100mg Tabletten einnehmen?

Virecta 100mg Tabletten sind eigentlich nur zur Behandlung der Erektionsstörung des Mannes bestimmt. Ein Einsatz zur Behandlung von Sexualfunktionsstörungen der Frau ist jedoch denkbar. Einige Untersuchungen belegten, dass der Virecta-Wirkstoff Sildenafil auch die Sexualstörungen bei einer Frau mindern kann. Viele Frauen leiden unter Depressionen, doch die Antidepressiva haben Orgasmusprobleme und eine zum Teil äusserst geringe Erregbarkeit zur Folge. Bei einer Studie von etwa 100 Frauen die Depressionsmittel einnahmen und etwa zwei Stunden vor dem Verkehr den Virecta-Wirkstoff Sildenafil konsumierten, bestätigten Zweidrittel der Anwenderinnen ein deutlich gesteigertes Sexualverlangen.

Kann ich Virecta 100mg Potenzmittel Tabletten ohne Rezept bekommen?

Ja! Der Wirkstoff Sildenafil wie er in Virecta 100mg Tabletten enthalten ist, ist weltweit wohl das meist gekaufte Potenzmittel. Virecta 100mg Tabletten bekommen Sie auf der Webseite www.pillenpeter.com ohne Rezept. Der rezeptfreie Kauf des weltbekanntesten Potenzmittels Virecta erleichtert Ihnen den preiswerten Einkauf eines Potenzmittels bei Erektile Dysfunktion (Impotenz). Sie erhalten jedoch weder durch den Hersteller bzw. auf oder durch www.pillenpeter.com irgendwelche Hilfestellungen, Beratungen oder sonstige pharmakologische, medizinische oder anderweitige Auskünfte über das Medikament Virecta oder Ihr persönliches, gesundheitliches Anliegen! Bevor Sie Medikamente, gleich welcher Art einnehmen, sollten Sie sich einen ärztlichen Rat einholen. Nur ein Arzt kann Sie ggf. beraten und Sie auf Risiken, Neben- und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, Lebens- oder Nahrungsergänzungsmitteln zu einer Potenzmitteltherapie hinweisen. Bei www.pillenpeter.com bekommen Sie Virecta 100mg Tabletten (Sildenafil 100mg Tabletten als Generikum) preiswert, versandkostenfrei, schnell direkt aus der EU (zollfrei) – rezeptfrei und verpackungsneutral – geliefert. Sie bestellen ohne Rezept und bezahlen - www.pillenpeter.com – liefert, ohne wenn und aber, diskret und ohne Wucherpreise, die Sie eventuell aus einer Apotheke (Versandapotheke) kennen. Der Versand erfolgt ausschliesslich auf Originalblister, ohne Umverpackung und ohne Packungsbeilage (diese bieten wir Ihnen deshalb hier zum Download an). PillenPeter (www.pillenpeter.com) möchte, dass Sie Ihr Leben geniessen! Gehen Sie bitte deshalb besonders verantwortungsvoll mit Ihrer Gesundheit um!

Allgemeine Hinweise zum Potenzmittel Virecta 100mg Tabletten

Virecta 100mg Tabletten gehören nicht in die Hände von Kindern und geistig verwirrten Personen!
Bitte bewahren Sie Ihre Virecta Potenzmittel aus Ägypten an einem für diesen Personenkreis unzugänglichen Ort auf!
Bitte lagern Sie Ihre Virecta 100mg Tabletten an einem dunklen, trockenem Ort – nicht über 30 °C !
Virecta 100mg Tabletten dürfen auf keinen Fall von Kindern, Jugendlichen, Schwangeren, Drogenkonsumenten, Gebrechlichen oder Greisen eingenommen werden. Ihre Virecta 100mg Tabletten werden in Ägypten, dem Land der Pharaonen und Pyramiden, sorgfältigst unter internationalen, pharmazeutischen Standards hergestellt. Bitte bewahren Sie die Virecta 100mg Tabletten nicht über das Verfallsdatum hinaus auf! Der Versand der Virecta 100mg Tabletten aus Ägypten erfolgt schnell und zuverlässig – ohne Zollprobleme - aus bzw. innerhalb der EU (Europäische Gemeinschaft)!

Interessantes: Virecta Potenzmittel enthalten als pharmakologischen Wirkstoff Sildenafilcitrat, Sildenafil als Citrat. Sildenafil ist der Freiname des Generikums. Sildenafil wird im lateinischen als Sildenafilum bezeichnet. Es gehört zur Wirkstoffklasse der PDE-5-Hemmer. Der Wirkmechanismus von Sildenafil beruht auf Enzymhemmung der Phosphodiesterase-5. Die Molare Masse beträgt 474,58 g·mol⁻¹. Die Summenformel lautet C₂₂H₃₀N₆O₄S – Die IUPAC Bezeichnung heisst 1-[[3-(1-Methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)- 4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- 4-methylpiperazin

Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit!

© www.pillenpeter.com – Packungsbeilage zum Download Seite 3
Bitte lesen Sie auch die folgende Seite 4!

Informationen zum Medikament Virecta 100 mg

Die Packungsbeilage zum Potenzmittel Virecta aus Ägypten in englischer Sprache:



The image shows the packaging for Virecta 100 mg Film-Coated Tablets. The top part is a dark blue box with the brand name 'Virecta' in a stylized, glowing font. Below the box, the text 'Film-Coated Tablets' is printed. The main body of the packaging is white and contains detailed information about the medication, including its composition, properties, indications, contraindications, drug interactions, precautions, side effects, dosage, and storage instructions. A logo for EVA Pharma is visible on the right side of the packaging.

Composition:
Each F.C. tablet contains:
Sildenafil (as citrate) 100 mg

Properties:
Virecta is a safe and effective oral treatment for erectile dysfunction (ED) in men. ED is the persistent inability to achieve or sustain an erection sufficient for satisfactory sexual performance, a satisfactory treatment for this condition relies on the relaxation of the smooth muscles of the corpora cavernosa to facilitate erection. Sildenafil citrate is a selective inhibitor of type V phosphodiesterase (PDE5) that enhances the effect of nitric oxide (NO) which is released in the corpora in response to sexual stimulation. The release of NO stimulates the enzyme guanylate cyclase to produce cyclic GMP, which in turn relaxes arterial smooth muscle. Cyclic GMP is then broken down by PDE5. Sildenafil as a PDE5 inhibitor prevents the breakdown of cyclic GMP and hence prolongs arterial relaxation and inflow of arterial blood and thereby enhances erection. Virecta therefore causes erection only in the context of sexual stimulation.

Indications:
For the treatment of erectile dysfunction

Contraindications:
-In patients with known hypersensitivity to sildenafil or any of the components of the tablet
-In patients who are using organic nitrates, concomitant therapy with Virecta may potentiate the hypotensive effect of nitrates.
-Not indicated for use in newborn, children or women
-In patients with pre-existing cardiovascular disease and those having atrophy of the optical nerve and decreased visual field.
-Prolonged erection greater than 4 hours (painful erection greater than 6 hours in duration) the patient should seek immediate medical assistance. If priapism is not treated immediately, penile tissue damage and permanent loss of potency could result.

Drug interactions:
-It is not recommended to use Virecta in combination with other treatments for erectile dysfunction
-Concomitant administration of the protease inhibitor ritonavir increases serum concentration of Sildenafil, also co-administration of the HIV protease inhibitor saquinavir increases the level of Sildenafil, caution should therefore be exercised in such patients.
-Co-administration of the potent cytochrome P450 3A4 inhibitors, Erythromycin, Ketoconazole and Itraconazole as well as the non specific CYP inhibitor Cimetidine increases the plasma level of Sildenafil through reduction of its clearance.
-The CYP stimulant Rifampin decreases plasma level of Sildenafil

Precautions & Warnings:
Virecta should be used with caution and under medical supervision in patients associated with the following conditions:
-Pre-existing cardiovascular disease such as angina, chest pain, heart failure, irregular heart beats, hypotension or hypertension.
-Severe hepatic or renal impairment
-Ages above 65 years
-Rare inherited disease of retinitis pigmentosa
-Blood diseases such as sickle cell anemia, multiple myeloma or leukemia, deformed penis, Peyronie's disease or an erection that lasted more than 4 hours
-Stomach ulcers or any type of bleeding problems

Side Effects:
With the prescribed dosage, the most common side effects, which are only mild to moderate effects that usually do not last longer than a few hours are headache, flushing of the face, dyspepsia, nasal congestion and to a lesser extent urinary tract infection, mild and transient color tinge to vision, sensitivity to light or blurred vision, diarrhea, dizziness and rash.
Other minor adverse effects that are less common and are not likely to occur are:
*Vomiting, glossitis, colitis, dysphagia, gastritis, gastroenteritis, stomatitis, dry mouth, abnormal liver function tests, rectal hemorrhage, gingivitis.
*Edema of the face, photosensitivity reaction, shock, asthenia, chills, abdominal pain, allergic reaction, chest pain
*Angina pectoris, AV block, migraine, syncope, tachycardia, palpitation, postural hypotension, myocardial ischemia, cerebral thrombosis, cardiac arrest, heart failure, abnormal electrocardiogram, cardiomyopathy
*Arthritis, arthrosis, myalgia, tendon rupture, tenosynovitis, bone pain, myasthenia and synovitis
*Anemia and leukopenia
*Thirst, edema, gout, diabetes, hyperglycemia, peripheral edema, hyperuricemia, hypoglycemic reactions, hyponatremia
*Ataxia, hyperreflexia, neuralgia, neuropathy, paresthesia, tremor, vertigo, depression, insomnia, somnolence, decreased reflexes and hypesthesia
*Asthma, dyspnea, laryngitis, pharyngitis, sinusitis, bronchitis, increased sputum and cough
*Urticaria, herpes simplex, pruritus, sweating, ulcer, contact & exfoliative dermatitis,
*Mydriasis, conjunctivitis, photophobia, tinnitus, eye pain, deafness, ear pain, hemorrhage, cataract, dry eyes
*Cystitis, nocturia, urinary frequency, breast enlargement, urinary incontinence, abnormal ejaculation, general edema and anorgasmia

Dosage and Administration:
Half to one tablet one hour before sexual activity. The maximum recommended dosing frequency is once per day
A dose of 25mg (1/4 tablet) should be used in patients with hepatic impairment, severe renal failure and age over 65 years old as a dose more than that may lead to increase in sildenafil serum level and so increase in both the efficacy and incidence of adverse effect.
Overdosage
The medication is stopped and standard supportive measures are to be immediately adopted.

Storage
Store below 30°C in a dry place
Keep out of the reach of children

Package:
Pack of three tablets

Manufactured by
EVA Pharma for Pharmaceuticals &
Medical Appliances, Egypt

© www.pillenpeter.com

© www.pillenpeter.com – Packungsbeilage zum Download Seite 4
Bitte lesen Sie alle Seiten dieser Packungsbeilage!